



Impfkalender (Standardimpfungen) für Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene; 2024

Impfung	Alter in Wochen	Alter in Monaten									Alter in Jahren									
		6	2	3	4	5–10	11*	12	13–14	15	16–23	2–4	5–6	7–8	9–14	15–16	17	ab 18	ab 60	
		U4			U5			U6			U7			U7a/U8	U9	U10	U11/J1	J2		
Rotaviren		G1 ^a	G2	(G3)																
Tetanus ^b			G1		G2		G3 ^d						A1		A2			A ^f		
Diphtherie ^b			G1		G2		G3 ^d						A1		A2			A ^f		
Pertussis ^b			G1		G2		G3 ^d						A1		A2			A3 ^f		
Hib ^b – <i>H. influenzae</i> Typ b			G1		G2		G3 ^d													
Poliomyelitis ^b			G1		G2		G3 ^d							A1						
Hepatitis B ^b			G1		G2		G3 ^d													
Pneumokokken ^b			G1		G2		G3 ^d													S ⁱ
Meningokokken B ^c			G1		G2			G3 ^d												
Meningokokken C								G1												
Masern							G1					G2							S ^e	
Mumps, Röteln							G1					G2								
Varizellen							G1					G2								
HPV – Humane Papillomviren													G1 ^e	G2 ^e						
Herpes zoster																			G1 ⁱ	G2 ⁱ
Influenza																				S (jährlich) ^k
COVID-19																			G1 ^h , G2 ^h , G3 ^h	S (jährlich) ^k

 Empfohlener Impfzeitpunkt

 Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

Erläuterungen

G Grundimmunisierung (in bis zu 3 Teilimpfungen G1–G3)

A Auffrischimpfung

S Standardimpfung

- a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen
- b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen; Säuglinge (inkl. Frühgeborene) werden mit PCV13 oder PCV15 geimpft
- c Gemäß Fachinformation besteht die Impfserie im Alter von 2–23 Monaten aus 3 Impfstoffdosen, ab dem Alter von 24 Monaten aus 2 Impfstoffdosen
- d Mindestabstand zur vorangegangenen Impfstoffdosis: 6 Monate
- e Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahre oder bei einem Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Impfstoffdosis ist eine 3. Impfstoffdosis erforderlich
- f Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung
- g Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
- h Mindestimpfabstand zwischen G1 und G2 ≥ 4 –12 Wochen, und zwischen G2 und G3 ≥ 6 Monate
- i Impfung mit PCV20
- j Zwei Impfstoffdosen des adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoffs im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten
- k Jährliche Impfung im Herbst
- * Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden